

BLUE BORDO® DISPERSS®



ORGANİK TARIMDA
KULLANILABİLİR



DÜŞÜK DOZLARDA ETKİLİ KULLANIMA HAZIR BORDO BULAMACI



- BLUE BORDO® DISPERSS®, organik tarım dahil olmak üzere bütün tarım uygulamalarında kullanılabilir.
- Mineral yapıdadır ve sentetik ürünlere alternatif oluşturmaktadır.
- Geniş spektrumlu etkiye sahiptir.
- Fransa'da üretilmektedir.
- Piyasada bulunan en kapsamlı ruhsatlardan birisine sahiptir ve uzun yıllar boyunca denenip test edilmiştir.



DISPERSS® kalitesi ile sunulan
BLUE BORDO®'yu kullanma ayrıcalığını yaşayın.

Ürün Geliştirme Müdürü
Burak Uğurer 0538 257 42 69

Ege Bölgesi Satış Temsilcisi
Cumhur Durgan 0538 057 34 08

Akdeniz Bölgesi Satış Temsilcisi
Necdet Okur 0538 054 90 96

Ürün Geliştirme Müdürü
Erdal Eraydın 0532 131 10 13

Ege Bölgesi Satış Temsilcisi - Fethiye
Ramazan Kaya 0538 057 34 08

İç Anadolu - Karadeniz Bölge Müdürü
İlker Aydın 0533 399 89 79

Marmara Bölgesi Satış Temsilcisi
Koray Solak 0533 150 31 77

Çukurova Bölgesi Teknik Temsilcisi
Erhan Sipahi 0533 150 01 79

Karadeniz Bölgesi Satış Temsilcisi
Ahmet Rasim Serdaroğlu 0538 257 59 71

Mersin Bölge Satış Sorumlusu
Mahmut Küçük 0533 150 60 41

GAP Bölge Müdürü
Ersen Erdoğan 0538 257 51 20

@upl-turkey

@upl.turkey

UPL Ziraat ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers No: 47B A Kule Kat: 31 D: 3107
35530 Bayraklı / İZMİR T: 0232. 446 57 89 - 90 F: 0232. 489 04 82 www.upl-ltd.com/tr



Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini okuyunuz.

Telif Hakkı © 2021 UPL. Tüm Hakları Saklıdır. BLUE BORDO® DISPERSS®, UPL logo ve OpenAg™, United Phosphorus Limited şirketinin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

BLUE BORDO® DISPERSS®

Etkili Madde: % 20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı
Formülasyon Şekli: Suda Dağılılabilen Granül (WG)
Grubu: M1 FUNGİSİT (Mantar İlacı)



Ambalaj:
0,8Kg & 2Kg & 10Kg

F U N G İ S İ T



ZEYTİN, MEYVE VE BAĞ'DA
HIZLI & ETKİN KORUMA

Düşük dozlarda etkili, kullanıma hazır bordo bulamacı



DISPERSS® teknolojisi UPL patentlidir.

Daha fazlası için
www.upl-ltd.com/tr




BLUE BORDO® DISPERSS®



DISPERSS® teknolojisi ile gelen fayda ve rahatlık

Köpürme yapmaz

BLUE BORDO® DISPERSS® ile karıştırma işlemi esnasında ve karıştırma durduğunda çabuk dağılan köpürme ve sınırlı miktarda köpük oluşumu ortaya çıkar. Bu sayede, karışım hazırlanırken çiftçiler, ilaçlı solüsyon kaybına yol açabilecek herhangi bir taşma veya su dolum alanında herhangi bir sıkıntı yaşamadan UPL'in diğer bitki koruma ürünleri ile tank karışımını yapabilirler.




Kolay çözülür

Bütün partiküller dibe çökmeden önce suda hemen çözülür. **BLUE BORDO® DISPERSS®**in bu özelliği ilacın hazırlanması ve uygulanması esnasında doğru dozda ürünün bitkiye ulaşmasını ve ilacın etkinliğinde herhangi bir kayba veya ilaçlama aletlerinin tıkanma riski olmadan hızlı ve düzgün bir karışıma ulaşabilmenizi sağlar.



Çökme yapmaz, tıkamaz

Yüzeyde öbek oluşumu olmaz ve dağılım mükemmel şekilde gerçekleşir. İlaçlama tankının tabanında birikmez, pompa veya ilaçlama aletlerinin başlıkları ile temas ettiğinde koruyucu filtrelerde tıkanmalara yol açmaz. Uygulamaya tekrar başlanmadan önce tıkanan öğelerin çıkarılıp temizlenmesi gerekmez. Bu dezavantajlı işlemler çiftçi için oldukça zahmetli, zaman alıcı ve pahalıdır. **BLUE BORDO® DISPERSS®** ile çiftçiler uygulamada herhangi bir sorunla karşılaşmaz.



BLUE BORDO® DISPERSS® sönmüş kireç ile nötrale edilmiş %80 bakır sülfat içeren gerçek bordo bulamacıdır.

BLUE BORDO® DISPERSS®; Büyük titizlikle sönmüş kireç ile nötrale edilmiş bir bakır solüsyonu ile hazırlanır. Tamamı nötrale edilmiş (Ph=7) olan bu bulamaç kademeli buharlaşma ile kurutulur, öğütülür ve granül haline getirilir.

Elementlerinin çabuk erimesi ve mükemmel nötrale sayesinde uzun süre hastalıklardan korur. Kimyasal yapısı ona kuvvetli bir yapışkanlık sağlar ve yağmurla yıkanmaz. Tamamı nötrale edilmiş olduğundan fitotoksite yapmaz.

BLUE BORDO® DISPERSS®, çok yönlü bir fungusittir. Çok sayıda bitki hastalıklarına karşı (Bağlarda mildiyö, ölükol, antraknoz, bakteriyel yanıklık, meyvelerde karaleke, monilya, dal kanseri, şeftali yaprak kıvrıcılığı ve zeytinde halkalı leke, dal kanseri ile çeşitli sebze hastalıkları) mücadelesinde bu güne kadar başarı ile kullanılan bir ilaçtır.

Düzenli kullanıldığı takdirde, büyük bir hızla gelişen bakteriyel hastalıkları önleyici yeri hiçbirşeyle değiştirilemeyen bakteriostatik bir güce sahiptir.

BLUE BORDO® DISPERSS®, özellikle **MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS®** (mikronize kükürt) ile karışabilir.



KULLANMA ŞEKLİ

Bağda Ölükol

Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
Yaz uygulaması:

1. Uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. Uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. Uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Mildiyösü

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamaya son verilmelidir.

Elma Karalekesi

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvrıcılığı

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Zeytinlerde Halkalı Leke

Marmara Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Ege Bölgesi'nde:

1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Akdeniz Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Kayısı Yaprak Delen (Çil)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayıslarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgilde Kahverengi Leke

Uygulamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması için bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Domates Mildiyösü

Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3 - 5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 - 12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Bağda ölükol (<i>Phomopsis viticola</i>)	3500 g/100 L su (kış uygulaması) 500 g/100 L su (yaz uygulaması)	14 gün
	Bağ mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g/100 L su	
ELMA	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
ŞEFTALİ	Şeftali yaprak kıvrıcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
ZEYTİN	Zeytinlerde halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i>)	1. Uygulama: 1500 g/100 L su 2. Uygulama: 1000 g/100 L su	14 gün
KAYISI	Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmata carpophila</i>)	1250 g/100 L su (Dormant dönem) 625 g/100 L su (Normal dönem)	14 gün
DOMATES	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 g/da	14 gün
MANDARİN	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f.sp.citri)	500 g / 100 L su	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.